4-1 関東・中部地方とその周辺の地震活動（2012年11月～2013年4月） Seismic Activity in and around the Kanto and Chubu Districts (November 2012 - April 2013)

気象庁
Japan Meteorological Agency

今期間、関東・中部地方とその周辺でM4.0以上の地震は370回、M5.0以上の地震は37回、M6.0以上の地震は5回発生した。このうち最大のものは、2012年12月7日に三陸沖で発生したM7.3の地震である。

2012年11月～2013年4月のM4.0以上の地震の震央分布を第1図(a)及び(b)に示す。
主な地震活動は以下のとおりである。

(1) 千葉県東方沖の地震（M5.5，最大震度3，第2図）

2012年11月16日17時25分に千葉県東方沖でM5.5の地震（最大震度3）が発生した。この地震の発震機構（CMT解）は北西－南東方向に張力軸を持つ正断層型であった。

今回の地震の震央周辺では、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」（M9.0，最大震度7，以下「東北地方太平洋沖地震」と呼ぶ）の発生以降、地震活動が以前より活発になっている。

(2) 茨城県北部の地震（M4.8，最大震度5弱，第7図）

2013年1月28日03時41分に茨城県北部の深さ74kmでM4.8の地震（最大震度5弱）が発生した。この地震は太平洋プレート内部で発生し、発震機構は東北東－西南西方向に張力軸を持つ正断層型であった。

1997年10月以降、今回の地震の震源付近では、M4.0以上の地震が時々発生している。

(3) 茨城県北部の地震（M4.7，最大震度5弱，第8図）

2013年1月31日23時53分に茨城県北部の深さ8kmでM4.7の地震（最大震度5弱）が発生した。この地震は地殻内で発生し、発震機構は北東－南西方向に張力軸を持つ正断層型である。

福島県浜通りから茨城県北部にかけての地殻内では、東北地方太平洋沖地震の発生後に活発な地震活動が発生した。活動は全体として低下してきており、震度5弱以上を観測した地震が発生したのは2012年3月以来である。この地震活動で発生している地震は正断層型の発震機構を持つものが多い。張力軸の方向は場所によって異なるが、今回の地震の震央付近では概ね北東－南西方向を向いている。

(4) 千葉県東方沖の地震（M5.6，最大震度3，第10図）

2013年2月19日21時27分に千葉県東方沖でM5.6の地震（最大震度3）が発生した。この地震の発震機構（CMT解）は西北西－東南東方向に張力軸を持つ型であった。

今回の地震の震央周辺では、東北地方太平洋沖地震の発生以降、地震活動が以前より活発になっている。

(5) 栃木県北部の地震 (M6.3, 最大震度5強, 第11図(a), (b))

2013年2月25日16時23分に栃木県北部の深さ3kmでM6.3の地震(最大震度5強)が発生した。この地震は地殻内で発生し、発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型であった。今回の地震の震央付近では、2月23日頃から地震活動が見られており、約1時間前の2月25日15時26分にもM3.6の地震(最大震度3)が発生していた。今回の地震の発生後、同日16時34分にM4.7の地震(最大震度4)が発生するなど活発な余震活動が見られた。

三次元速度構造モデルを使用して震源を再計算した結果は、一元化震源より概ね2km程度浅くなった。

(6) 三宅島近海の地震 (M6.2, 最大震度5弱, 第18図(a),(b))

2013年4月17日10時過ぎから三宅島近海で地震活動が活発になり、同日17時57分に三宅島近海の深さ9kmでM6.2の地震(最大震度5強)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は、北北西-南南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型であった。

この地震により、三宅島坪田で7cm、三宅島阿古で6cmの津波を観測した。この地震により、負傷者1人の被害が生じた(総務省消防庁による)。

波形相関を用いたDouble-Difference法による解析では、南北方向に延びる震源分布のほか、東西方向に延びる震源分布もみられた。

(7) 鳥島近海の地震 (M6.4, 最大震度2, 第19図)

2013年4月21日12時22分に鳥島近海の深さ447kmでM6.4の地震(最大震度2)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は、太平洋プレートの傾斜方向に圧力軸を持つ型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。

(8) 千葉県東方沖の地震 (M5.6, 最大震度3, 第20図)

2013年4月29日22時01分に千葉県東方沖の深さ34kmでM5.6の地震(最大震度3)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震であった。

今回の地震の震源付近では、東北地方太平洋沖地震の発生以降地震活動がやや活発になっている。

(次ページに続く)

(9) その他の主な地震活動

発生年月日	震央地名	地震の規模(M)	震源の深さ(km)	最大震度	
2012年					
11月24日	東京湾	4.8	72	4	(第3図)
12月 7日	千葉県北西部	4.6	67	3	(第4図)
12月15日	茨城県沖	5.0	32	4	(第5図)
2013年					
1月22日	千葉県東方沖	5.1	16	4	(第6図)
2月 9日	茨城県沖	5.2	33	4	(第9図)
3月18日	茨城県北部	4.4	56	4	(第12図)
3月21日	茨城県北部	4.7	72	3	(第13図)
4月 4日	石川県加賀地方	4.2	13	4	(第14図)
4月 4日	千葉県東方沖	5.1	12	4	(第15図)
4月19日	千葉県東方沖	4.6	15	4	(第15図)
4月 6日	茨城県沖	5.2	49	3	(第16図)
4月14日	埼玉県南部	4.6	97	3	(第17図)

第1図(a) 関東・中部地方とその周辺の地震活動 (2012年11月~2013年1月, $M \geq 4.0$, 深さ ≤ 700 km)
Fig.1(a) Seismic activity in and around the Kanto and Chubu districts (November 2012 - January 2013, $M \geq 4.0$, depth ≤ 700 km).

第1図(b) つづき (2013年2月~4月, $M \geq 4.0$, 深さ ≤ 700 km)
Fig.1(b) Continued (February - April 2013, $M \geq 4.0$, depth ≤ 700 km).

11月16日 千葉県東方沖の地震

震央分布図※
 (1997年10月1日~2012年11月30日、
 深さ0~120km、 $M \geq 3.0$)
 2011年3月以降の地震を濃く表示
 発震機構はCMT解

※ 2011年3月13日~5月30日に未処理のデータがある。

2012年11月16日17時25分に千葉県東方沖でM5.5の地震(最大震度3)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は北西-南東方向に張力軸を持つ正断層型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域a)では、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生以降、地震活動が以前より活発になっており、2011年3月22日と2012年2月29日にM5.9の地震(ともに最大震度4)が発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域b)では、M6.0以上の地震が時々発生している。そのうち、1987年12月17日に発生したM6.7の地震(最大震度5)では、千葉県を中心に死者2人、負傷者161人、住家全壊16棟、住家半壊102棟等の被害を生じた(「最新版 日本被害地震総覧」による)。

領域a内のM-T図※

震央分布図 (1923年1月1日~2012年11月30日、
 深さ0~120km、 $M \geq 6.0$)

★は今回の地震の震央位置

領域b内のM-T図

第2図 2012年11月16日 千葉県東方沖の地震
 Fig.2 The earthquake east off Chiba prefecture on November 16, 2012.

11月24日 東京湾の地震

気象庁はこの地震に対して〔千葉県北西部〕で情報発表した。

震央分布図* (1997年10月1日～2012年11月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 2.0$)
2012年11月以降の地震を濃く表示

領域aの断面図 (東西投影)

震央分布図 (1923年1月1日～2012年11月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 5.0$)

★は今回の地震の震央位置

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

2012年11月24日17時59分に東京湾の深さ72kmで $M 4.8$ の地震 (最大震度4) が発生した。この地震の発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近 (領域b) は、活動が活発な領域であり、 $M 5.0$ 以上の地震が時々発生している。そのうち、2005年7月23日に発生した $M 6.0$ の地震 (最大震度5強) では、負傷者38人、住家一部破損12棟などの被害を生じた (総務省消防庁による)。また、「平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震」の発生以降、地震活動がより活発になっている。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺 (領域c) では、 $M 6.0$ 以上の地震が時々発生している。そのうち、1980年9月25日に発生した $M 6.0$ の地震 (最大震度4) では、死者2人、負傷者73人などの被害を生じた (『最新版 日本被害地震総覧』による)。

領域b内のM-T図及び回数積算図

領域c内のM-T図

第3図 2012年11月24日 東京湾の地震
Fig.3 The earthquake in Tokyo bay on November 24, 2012.

12月7日 千葉県北西部の地震

震央分布図* (1997年10月1日~2012年12月31日、
深さ0~120km、 $M \geq 2.0$)
2012年12月の地震を濃く表示

領域aの断面図 (東西投影)

震央分布図 (1923年1月1日~2012年12月31日、
深さ0~120km、 $M \geq 5.0$)

★は今回の地震の震央位置

※ 2011年3月13日~5月30日に未処理のデータがある。

2012年12月7日05時32分に千葉県北西部の深さ67kmで $M 4.6$ の地震 (最大震度3) が発生した。この地震の発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震である。また、今回の地震の震源付近 (領域b) では13日にも $M 4.2$ の地震 (最大震度2) が発生している。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近 (領域b) は、活動が活発な領域で $M 4.0$ 以上の地震がしばしば発生しており、2012年11月24日にも $M 4.8$ の地震 (最大震度4) が発生している。また、2005年7月23日に発生した $M 6.0$ の地震 (最大震度5強) では、負傷者38人、住家一部破損12棟などの被害を生じた (総務省消防庁による)。「平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震」の発生以降、地震活動がより活発になっている。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺 (領域c) では、 $M 6.0$ 以上の地震が時々発生している。そのうち、1980年9月25日に発生した $M 6.0$ の地震 (最大震度4) では、死者2人、負傷者73人などの被害を生じた (「最新版 日本被害地震総覧」による)。

領域b内のM-T図及び回数積算図

領域c内のM-T図

第4図 2012年12月7日 千葉県北西部の地震

Fig.4 The earthquake in the northwest part of Chiba prefecture on December 7, 2012.

12月15日 茨城県沖の地震

2012年12月15日14時46分に茨城県沖でM5.0の地震(最大震度4)が発生した。この地震の発震機構は東西方向に張力軸を持つ正断層型で、陸のプレートの地殻内で発生した地震である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)では、M3.0以上の地震は発生していなかったが、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」発生後、地震活動が活発になり、M4.0以上の地震がしばしば発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、M6.0以上の地震がしばしば発生している。最大の地震は2011年3月11日に発生したM7.6の地震(東北地方太平洋沖地震の最大余震、最大震度6強)である。

領域b内のM-T図*

領域c内のM-T図

第5図 2012年12月15日 茨城県沖の地震
 Fig.5 The earthquake off Ibaraki prefecture on December 15, 2012.

1月22日 千葉県東方沖の地震

気象庁はこの地震に対して〔茨城県沖〕で情報発表した。

震央分布図* (1997年10月1日~2013年1月31日、
深さ0~120km、M≥3.0)
2013年1月の地震を濃く表示
発震機構はCMT解

2013年1月22日04時46分に千葉県東方沖の深さ16kmでM5.1の地震（最大震度4）が発生した。この地震は地殻内で発生し、発震機構（CMT解）は西北西-東南東方向に張力軸を持つ正断層型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近（領域b）では、M3.0以上の地震はほとんど発生していなかったが、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の発生以降地震活動が活発になり、M4.0以上の地震がしばしば発生している。そのうち、2012年3月14日に発生したM6.1の地震（最大震度5強）では、死者1人、負傷者1人、住家一部破損3棟などの被害を生じた（総務省消防庁による）。

2013年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺（領域c）では、M6.0以上の地震がしばしば発生している。最大の地震は2011年3月11日に発生したM7.6の地震（東北地方太平洋沖地震の最大余震、最大震度6強）である。

領域a内の断面図（東西投影）*

領域b内のM-T図及び回数積算図*

震央分布図 (2013年1月1日~2013年1月31日、
深さ0~120km、M≥6.0)

領域c内のM-T図

★は今回の地震の震央位置

* 2011年3月13日~5月30日に未処理のデータがある。

第6図 2013年1月22日 千葉県東方沖の地震
Fig.6 The earthquake east off Chiba prefecture on January 22, 2013.

1月28日 茨城県北部の地震

領域 a 内の断面図※ (A-B 投影)

震央分布図

(1923年1月1日～2013年1月31日、
 深さ0～120km、M≥5.0)

★は今回の地震の震央位置

2013年1月28日03時41分に茨城県北部の深さ74kmでM4.8の地震(最大震度5弱)が発生した。この地震は太平洋プレート内部で発生し、発震機構は東北東-西南西方向に張力軸を持つ正断層型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)では、M4.0以上の地震が時々発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、M5.0以上の地震がしばしば発生している。そのうち、1930年6月1日に発生したM6.5の地震(最大震度5)では、崖崩れや煙突倒壊などの被害を生じた(「最新版 日本被害地震総覧」による)。

領域 b 内の M-T 図※

領域 c 内の M-T 図

第7図 2013年1月28日 茨城県北部の地震
 Fig.7 The earthquake in the northern part of Ibaraki prefecture on January 28, 2013.

1月31日 茨城県北部の地震

2013年1月31日23時53分に茨城県北部の深さ8kmでM4.7の地震（最大震度5弱）が発生した。この地震は地殻内で発生した。発震機構は北東-南西方向に張力軸を持つ正断層型である。

福島県浜通りから茨城県北部にかけての地殻内（領域a）では、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の発生後に活発な地震活動が発生した。活動は全体として低下してきており、震度5弱以上を観測した地震が発生したのは2012年3月以来である。この地震活動で発生している地震は正断層型の発震機構を持つものが多い。張力軸の方向は場所によって異なるが、今回の地震の震央付近では概ね北東-南西方向を向いている。

1991年から東北地方太平洋沖地震発生前までの活動を見ると、この地域ではM3.0以上の地震はほとんど発生していなかった。発震機構が決まっている地震が1つあり、その地震の震央付近で現在発生している地震と同じような型である。

震央分布図
(1991年1月1日~東北地方太平洋沖地震発生前、深さ0~20km、M≥2.0)

領域a内の地震の発震機構の型

領域b内のM-T図

第8図 2013年1月31日 茨城県北部の地震
Fig.8 The earthquake in the northern part of Ibaraki prefecture on January 31, 2013.

2月9日 茨城県沖の地震

領域 a 内の断面図※ (A-B 投影)

震央分布図

(1923年1月1日～2013年2月28日、
深さ0～120km、 $M \geq 6.0$)

★は今回の地震の震央位置

2013年2月9日13時43分に茨城県沖でM5.2の地震(最大震度4)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は西北西-東南東方向に張力軸を持つ正断層型で、陸のプレートの地殻内で発生した地震である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)では、M3.0以上の地震はほとんど発生していなかったが、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」発生後、地震活動が活発になり、M5.0以上の地震がしばしば発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、M6.0以上の地震がしばしば発生しており、1938年11月5日のM7.5の地震(福島県東方沖地震)を含む活動や1987年2月6日のM6.7の地震を含む活動などのまとまった活動も見られている。

領域 b 内の M-T 図※

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

領域 c 内の M-T 図

第9図 2013年2月9日 茨城県沖の地震
Fig.9 The earthquake off Ibaraki prefecture on February 9, 2013.

2月19日 千葉県東方沖の地震

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

2013年2月19日21時27分に千葉県東方沖でM5.6の地震(最大震度3)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は西北西-東南東方向に張力軸を持つ型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域a)では、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生以降、地震活動が以前より活発になっており、M5.0以上の地震がしばしば発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域b)では、M6.0以上の地震が時々発生している。そのうち、1987年12月17日に発生したM6.7の地震(最大震度5)では、千葉県を中心に、死者2人、負傷者161人、住家全壊16棟、住家半壊102棟等の被害を生じた(「最新版 日本被害地震総覧」による)。

震央分布図 (1923年1月1日～2013年2月28日、
 深さ0～120km、 $M \geq 6.0$)

領域a内のM-T図※

領域b内のM-T図

第10図 2013年2月19日 千葉県東方沖の地震
 Fig.10 The earthquake east off Chiba prefecture on February 19, 2013.

2月25日 栃木県北部の地震

2013年2月25日16時23分に栃木県北部の深さ3kmでM6.3の地震(最大震度5強)が発生した。この地震は地殻内で発生し、発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型であった。今回の地震の震央付近(領域a)では、2月23日頃から地震活動が見られており、約1時間前の2月25日15時26分にもM3.6の地震(最大震度3)が発生していた。今回の地震の発生後、活発な余震活動が見られ、同日16時34分にM4.7の地震(最大震度4)が発生するなど3月12日までに震度1以上を観測する余震が65回発生している。

第11図(a) 2013年2月25日 栃木県北部の地震

Fig.11(a) The earthquake in the northern part of Tochigi prefecture on February 25, 2013.

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近(領域a)では、今回の地震の震央より南西に約5km離れたところで2001年3月31日にM5.2の地震(最大震度4)が発生しているが、その活動を除くと「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生以前はM4.0以上の地震は発生していなかった。東北地方太平洋沖地震の発生後は地震活動が活発になり、2012年12月17日にM3.7の地震(最大震度3)が発生している。

震央分布図 (1923年1月1日~2013年3月12日、深さ0~60km、M $\geq$ 5.0)

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域b)では、1949年12月26日に今市地震(M6.4)が発生しており、死者10人、負傷者163人、住家全壊290棟などの被害を生じた(「最新版 日本被害地震総覧」による)。今市地震とその余震を除くと、今回の地震の震央周辺ではM5.0以上の地震はほとんど発生していなかった。

2月25日 栃木県北部の地震（3次元速度構造による再計算）

※1 勝間田 三次元不均質構造における震源計算の高速化(3): 2010, 日本地球惑星科学連合 2010 大会

※2 Nakamura, M. et al., 2008: Three-dimensional P- and S-wave velocity structures beneath Japan, Phys. Earth Planet.

第11図(b) 2013年2月25日 栃木県北部の地震（3次元速度構造による再計算）
Fig.11(b) Hypocenter relocation in a three-dimensionally velocity-structure.

3月18日 茨城県北部の地震

領域 a 内の断面図※ (A-B 投影)

震央分布図
(1923年1月1日～2013年3月31日、
深さ0～120km、 $M \geq 5.0$)

★は今回の地震の震央位置

2013年3月18日06時53分に茨城県北部の深さ56kmでM4.4の地震(最大震度4)が発生した。この地震の発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)は、活動が活発な領域でM4.0以上の地震がしばしば発生しており、2012年3月1日にはM5.3の地震(最大震度5弱)が発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、M5.0以上の地震がしばしば発生している。そのうち、1930年6月1日に発生したM6.5の地震(最大震度5)では、がけ崩れ、煙突倒壊などの被害を生じた(「最新版 日本被害地震総覧」による)。

領域 b 内の M-T 図※

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

領域 c 内の M-T 図

第12図 2013年3月18日 茨城県北部の地震

Fig.12 The earthquake in the northern part of Ibaraki prefecture on March 18, 2013.

3月21日 茨城県北部の地震

領域 a 内の断面図※ (A-B 投影)

震央分布図

(1923年1月1日～2013年3月31日、
深さ30～120km、M≥5.0)

★は今回の地震の震央位置

2013年3月21日14時34分に茨城県北部の深さ72kmでM4.7の地震(最大震度3)が発生した。この地震の発震機構は、太平洋プレートの傾斜方向に圧力軸を持つ型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)では、M4.0以上の地震が時々発生しており、2013年1月28日にM4.8の地震(最大震度5弱)が発生している。

1923年1月以降の30kmより深い地震活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、1980年代前半まではM5.0以上の地震が時々発生していたが、それ以降は発生していない。

領域 b 内の M-T 図※

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

領域 c 内の M-T 図

第13図 2013年3月21日 茨城県北部の地震

Fig.13 The earthquake in the northern part of Ibaraki prefecture on March 21, 2013.

4月4日 石川県加賀地方の地震

2013年4月4日01時58分に石川県加賀地方の深さ13kmでM4.2の地震(最大震度4)が発生した。この地震は地殻内で発生し、発震機構は東西方向に圧力軸を持つ型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近(領域a)では、2007年6月22日にM4.6の地震(最大震度4)が発生しているが、それ以外にM4.0以上の地震は発生していなかった。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央付近(領域b)では、1928年2月7日のM4.8の地震(最大震度2)など、M4.0を超える地震が今回の地震を含めて6回発生している。

第14図 2013年4月4日 石川県加賀地方の地震
Fig. 14 The earthquake in Kaga region of Ishikawa prefecture on April 4, 2013.

4月4日、19日 千葉県東方沖の地震

★は今回の地震の震央位置

*2011年3月13日~5月30日に未処理のデータがある。

2013年4月4日13時42分に千葉県東方沖の深さ12kmでM5.1の地震(最大震度4、①)が発生した。この地震は陸のプレートの地殻内で発生し、発震機構(CMT解)は西北西-東南東方向に張力軸を持つ正断層型であった。また、19日23時11分に千葉県東方沖の深さ15kmでM4.6の地震(最大震度4、②)が発生した。この地震も地殻内で発生し、発震機構は東西方向に張力軸を持つ横ずれ断層型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)では、M3.0以上の地震はほとんど発生していなかったが、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生以降地震活動が活発になり、M4.0以上の地震がしばしば発生している。そのうち、2012年3月14日に発生したM6.1の地震(最大震度5強)では、死者1人、負傷者1人、住家一部破損3棟などの被害を生じた(総務省消防庁による)。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、M6.0以上の地震がしばしば発生している。最大の地震は2011年3月11日に発生したM7.6の地震(東北地方太平洋沖地震の最大余震、最大震度6強)である。

領域b内のM-T図*

第15図 2013年4月4日、19日 千葉県東方沖の地震

Fig.15 The earthquake east off Chiba prefecture on April 4 and 19, 2013.

4月6日 茨城県沖の地震

★は今回の地震の震央位置

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

2013年4月6日05時00分に茨城県沖の深さ49kmでM5.2の地震（最大震度3）が発生した。この地震の発震機構（CMT解）は北西-南東方向に張力軸を持つ正断層型である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近（領域b）では、M4.0以上の地震がしばしば発生しており、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」発生以降、地震活動が以前より活発になっている。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺（領域c）では、M6.0以上の地震がしばしば発生している。1938年11月5日にはM7.5の地震が発生し、宮城県花洲で113cm（全振幅）の津波が観測され、死者1人、負傷者9人、住家全壊4棟、半壊29棟などの被害を生じた（「最新版 日本被害地震総覧」による）。

第16図 2013年4月6日 茨城県沖の地震
 Fig.16 The earthquake off Ibaraki prefecture on April 6, 2013.

4月14日 埼玉県南部の地震

情報発表に用いた震央地名は〔埼玉県北部〕である。

2013年4月14日10時22分に埼玉県南部の深さ97kmでM4.6の地震(最大震度3)が発生した。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ型であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近(領域b)では、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の発生以降、M4.0を超える地震が発生するなど、地震活動が活発になっている。

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域c)では、M6.0以上の地震が5回発生している。そのうち、1968年7月1日に発生した地震(M6.1)では、負傷者7人、家屋一部破損15棟等の被害が生じた。(「最新版 日本被害地震総覧」による)。

領域b内のM-T図及び回数積算図

震央分布図(1923年1月1日~2013年4月30日、
深さ0~150km、M $\geq$ 5.0)

★は今回の地震の震央位置

※2011年3月13日~5月30日に未処理のデータがある。

第17図 2013年4月14日 埼玉県南部の地震

Fig.17 The earthquake in the southern part of Saitama prefecture on April 14, 2013.

4月17日 三宅島近海の地震

2013年4月17日10時過ぎから三宅島近海で地震活動が活発になり、同日17時57分に三宅島近海の深さ9kmでM_s 6.2の地震(最大震度5強)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は、北北西-南南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型であった。

気象庁はこの地震に対して、同日18時02分に伊豆諸島、静岡県の沿岸に対して津波予報(若干の海面変動)を発表した。この地震により、三宅島坪田で7cm、三宅島阿古で6cmの津波を観測した。この地震により、負傷者1人の被害が生じた(総務省消防庁による)。

今回の地震活動が活発になった17日10時過ぎ以降24時間以内に、震度1以上を観測した地震が46回発生した(最大震度別の内訳は、震度5強:1回、震度3:7回、震度2:11回、震度1:27回)。その後は4月30日までに、震度2以上を観測した地震は発生していない(震度1を観測した地震が7回発生)。

1997年1月以降の活動を見ると、新島・神津島から三宅島にかけての領域aで、三宅島の火山活動が活発であった2000年の、7月から8月にはM_s 6.0以上の地震が6回発生している。

震度1以上を観測した地震 (4月17日～30日)

発生日時	M	最大震度	発生日時	M	最大震度
1 4/17 10時15分	4.4	2	28 4/17 18時36分	3.2	1
2 4/17 10時15分	3.3	2	29 4/17 18時56分	2.5	1
3 4/17 11時13分	4.6	3	30 4/17 18時02分	2.7	1
4 4/17 11時15分	4.6	3	31 4/17 18時25分	3.0	1
5 4/17 11時54分	2.9	1	32 4/17 18時47分	3.3	1
6 4/17 12時01分	3.0	1	33 4/17 18時52分	3.0	1
7 4/17 12時12分	3.8	2	34 4/17 20時15分	2.6	1
8 4/17 12時22分	4.6	3	35 4/17 20時27分	2.7	1
9 4/17 12時23分	4.0	3	36 4/17 20時33分	3.2	2
10 4/17 12時29分	3.2	2	37 4/17 21時10分	3.1	1
11 4/17 12時36分	2.7	1	38 4/17 21時20分	2.7	1
12 4/17 14時29分	2.9	2	39 4/17 22時10分	2.3	1
13 4/17 14時32分	3.4	2	40 4/17 22時15分	3.5	2
14 4/17 16時52分	2.7	1	41 4/17 22時21分	2.1	1
15 4/17 17時55分	2.5	2	42 4/17 23時15分	2.5	1
16 4/17 17時57分	6.2	5強	43 4/17 23時17分	2.8	2
17 4/17 17時59分	4.3	3	44 4/17 23時47分	2.9	1
18 4/17 18時00分	3.6	1	45 4/18 0時22分	2.9	1
19 4/17 18時01分	3.9	2	46 4/18 0時46分	2.6	1
20 4/17 18時05分	3.2	1	47 4/18 1時15分	2.5	1
21 4/17 18時06分	3.4	2	48 4/18 1時46分	3.0	1
22 4/17 18時07分	3.5	3	49 4/18 2時29分	2.9	1
23 4/17 18時08分	2.7	1	50 4/19 18時03分	3.1	1
24 4/17 18時15分	3.6	2	51 4/20 18時04分	2.3	1
25 4/17 18時14分	3.1	1	52 4/22 18時24分	2.8	1
26 4/17 18時15分	2.9	1	53 4/30 18時02分	2.6	1
27 4/17 18時24分	2.2	1			

※4/17 17時57分の地震(M_s 6.2)の約15秒前に、M_s 1.1の地震が発生しているが、ほぼ同じ場所で発生した地震であるため震度の分離ができない。

震央分布図 (1923年1月1日～2013年4月30日、深さ0～20km、M_s≥5.0) 2013年4月の地震を濃く表示

1923年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域b)では、M_s 5.0を超える地震がしばしば発生しており、M_s 6.0を超える地震も今回の地震を含めて16回発生している。

津波の観測状況

津波観測点名	所属	第一波		最大波	
		到達時刻	高さ(cm)*1	発現時刻	高さ(cm)
三宅島坪田	気象庁	17日 18:08	+4	17日 18:14	7
三宅島阿古	海上保安庁	17日 17:59	-4	17日 18:04	6

※ 値は後日変更される場合がある。
※ 所属機関の観測波形データをもとに気象庁で精査した値(観測データにバンドパスフィルターをかけた、その波形を用いて作成している)。
*1 高さの+は押し、-は引き。

※本資料では、津波情報で発表する観測点名称を用いている。

第18図(a) 2013年4月17日 三宅島近海の地震
Fig.18(a) The earthquake near Miyake Island on April 17, 2013.

第18図(a) 2013年4月17日 三宅島近海の地震
Fig.18(a) The earthquake near Miyake Island on April 17, 2013.

三宅島近海の地震 一元化震源とDD法との比較

第18図(b) 2013年4月17日 三宅島近海の地震 (DD震源との比較)

Fig.18(b) Comparison with the hypocenter distribution by the Double-Difference Method.

4月21日 鳥島近海の地震

震央分布図 (1997年10月1日~2013年4月30日、 $M \geq 5.0$ 、深さ0~700km)

領域 a の断面図 (A-B 投影、 $M \geq 3.0$)

震央分布図 (1923年1月1日~2013年4月30日、 $M \geq 6.0$ 、深さ200~700km) N=100

2013年4月21日12時22分に鳥島近海の深さ447kmでM6.4の地震(最大震度2)が発生した。この地震の発震機構(CMT解)は、太平洋プレートの傾斜方向に圧力軸を持つ型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。

今回の地震では、沈み込む太平洋プレート内を伝わった地震波により、東北地方から関東地方にかけての太平洋側を中心に震度1以上を観測している(異常震域と呼ばれることがある)。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺(領域a)では、2000年8月6日にM7.2の地震(最大震度4)が発生している。

1923年1月以降の活動を見ると、伊豆諸島から小笠原諸島にかけての沈み込む太平洋プレート内部(領域b)では、M7.0以上の地震が度々発生している。

領域 a 内の M-T 図 (深さ 200~700km)

領域 b 内の M-T 図

第19図 2013年4月21日 鳥島近海の地震

Fig.19 The earthquake near Torishima Island on April 21, 2013.

4月29日 千葉県東方沖の地震

震央分布図※

情報発表に用いた震央地名は「茨城県沖」である。

(1997年10月1日～2013年4月30日、深さ0～120km、 $M \geq 3.0$) 2013年4月の地震を濃く表示
発震機構はCMT解

2013年4月29日22時01分に千葉県東方沖の深さ34kmでM5.6の地震 (最大震度3) が発生した。この地震の発震機構 (CMT解) は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震であった。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近 (領域b) では、「平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震」の発生以降地震活動がやや活発になっている。

2013年1月以降の活動を見ると、今回の地震の震央周辺 (領域c) では、M6.0以上の地震がしばしば発生している。最大の地震は2011年3月11日に発生したM7.6の地震 (東北地方太平洋沖地震の最大余震、最大震度6強) である。

領域b内のM-T図※

震央分布図
(2013年1月1日～2013年4月30日、
深さ0～120km、 $M \geq 6.0$)

領域c内のM-T図

★は今回の地震の震央位置

※ 2011年3月13日～5月30日に未処理のデータがある。

第20図 2013年4月29日 千葉県東方沖の地震
Fig.20 The earthquake east off Chiba prefecture on April 29, 2013.