枕　崎　（2502）

観測開始:1956年4月　所在地:鹿児島県枕崎市松之尾町

（単位：m）

観測年月				1961.1（昭和36年）	1963.1（昭和38年）	1966.3（昭和41年）	1969.6（昭和44年）	1969.1（昭和44年）	
取付水準点		Ⅱ－368	標高(m)	10.309	—	10.309	10.309	験潮場移設	
距離(km)	2.60	B・M	高低差(m)	-8.1412	—	-8.220	-8.2188		
	0.02	球分体			+0.079	+0.079	+0.0799		
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準		
備考					B･M 再設				

観測年月				1969.6（昭和44年）	1971.9（昭和46年）	1975.12（昭和50年）	1979.11（昭和54年）	1981.1（昭和56年）	1993.9（平成5年）
取付水準点		Ⅱ－368	標高(m)	—	10.350	—	—	10.350	10.350
距離(km)	2.60	B・M	高低差(m)	—	-8.265	—	—	-8.266	-7.4897
	0.02	球分体		+2.004	+1.994	+2.000	+1.999	+1.998	+1.2169
観測方法				1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考					Ⅱ-368移転（1970.9）				

観測年月				2000.1（平成12年）	2002.4（平成14年）	2004.11（平成16年）	2011.12（平成23年）	2016.9（平成28年）	2021.9（令和3年）
取付水準点		Ⅱ－368	標高(m)	10.350	10.637	10.611	9.836	9.836	9.836
距離(km)	2.60	B・M	高低差(m)	-7.4905	-7.4905	-6.268	-6.715	-6.7151	-6.7190
	0.02	球分体		+1.2206	+1.2260		+1.221	+1.2224	+1.2210
観測方法				1級水準	1級水準	二等水準	2級水準	1級水準	1級水準
備考					2000年平均成果に切換	Ⅱ-368改測（2004.9）	Ⅱ-368移転（2009.6）		

観測年月				2025.4（令和7年）					
取付水準点		Ⅱ－368	標高(m)	9.738					
距離(km)	2.60	B・M	高低差(m)	—					
	0.02	球分体		—					
観測方法									
備考				測地成果2024に切換					

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>