

枕 崎 (2502)

観測開始:1956年4月 所在地:鹿児島県枕崎市松之尾町

(単位:m)

観測年月			1961.1 (昭和36年)	1963.1 (昭和38年)	1966.3 (昭和41年)	1969.6 (昭和44年)	1969.1 (昭和44年)						
取付水準点	距離 (km)	II-368	10.309	—	10.309	10.309	—	—					
		2.60							B・M	—	-8.220	-8.2188	—
		0.02											
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準							
備考				B・M再設									

観測年月			1969.6 (昭和44年)	1971.9 (昭和46年)	1975.12 (昭和50年)	1979.11 (昭和54年)	1981.1 (昭和56年)	1993.9 (平成5年)					
取付水準点	距離 (km)	II-368	—	10.350	—	—	10.350	10.350					
		2.60							B・M	—	—	-8.266	-7.4897
		0.02											
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準					
備考				II-368移転 (1970.9)									

観測年月			2000.1 (平成12年)	2002.4 (平成14年)	2004.11 (平成16年)	2011.12 (平成23年)	2016.9 (平成28年)	2021.9 (令和3年)							
取付水準点	距離 (km)	II-368	10.350	10.637	10.611	9.836	9.836	9.836							
		2.60							B・M	-7.4905	-7.4905	-6.268	-6.715	-6.7151	-6.7190
		0.02													
観測方法			1級水準	1級水準	二等水準	2級水準	1級水準	1級水準							
備考				2000年平均 成果に切換	II-368改測 (2004.9)	II-368移転 (2009.6)									

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。