

1－3 日本全国の地殻変動

Crustal Deformations of Entire Japan

国土地理院

Geospatial Information Authority of Japan

[GNSS]

第1～6図は、GEONETによるGNSS連続観測から求めた全国の水平地殻変動（2018年4月～2019年4月の1年間及び2019年1月～4月の3か月間）である。固定局（☆の点）は、長崎県五島列島の福江観測点である。国土地理院ではアンテナ交換や観測点周辺の樹木の伐採等の保守を行っており、これに伴うオフセットの補正を後日F3解が得られてから行っている。基準期間と比較期間を含む期間中にアンテナ交換が行われ、それによるオフセットを補正した観測点の変動ベクトルは、補正誤差が含まれる可能性があるため、白抜き矢印で示し区別している。

[GNSS 1年間]

第1図の最近1年間の北海道・東北地方の図においては、2011年3月11日に発生した平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（M9.0，最大震度7）の後に続く余効変動が顕著である。また、2018年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震（M6.7，最大震度7）に伴う地殻変動が見られる。そのほか、道東地方では千島海溝沿いの太平洋プレートの沈み込みに伴う北西向きの変動が見られる。

第2図の日本列島中央部の図においては、東北地方太平洋沖地震後の余効変動の影響が見られる。東海地方から四国にかけて、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う北西向きの変動が見られる。そのほか、小笠原村の硫黄島（いおうとう）では、火山性の地殻変動が見られる。

第3図の日本列島西部の図においては、2019年1月8日に発生した種子島近海の地震（M6.0，最大震度4）の地震に伴う地殻変動が見られる。また、中国・四国地方の西部から九州地方にかけて、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う変動が見られる。そのほか、九州地方では定常状態と比べて僅かに南北に開く成分が大きく、2016年4月に発生した平成28年（2016年）熊本地震の余効変動が重畳していると考えられる。

[GNSS 3か月]

第4～6図は、最近3か月間の水平変動ベクトル図である。

第4図の北海道・東北地方では、東北地方太平洋沖地震後の余効変動の影響が見られる。そのほか、道東地方では千島海溝沿いの太平洋プレートの沈み込みに伴う北西向きの変動ベクトルが見られる。

第5図の日本列島中央部では、東北地方太平洋沖地震後の余効変動の影響が東北地方を中心に見られる。紀伊半島から四国にかけては南海トラフ沿いのプレートの沈み込みに伴う北西向きの変動が見られる。四国西部では、日向灘北部・豊後水道で2018年春頃から始まったプレート間の長期的ゆっくりすべり（以下、長期的SSEと呼ぶ）に伴う地殻変動が見られる。そのほか、小笠原村の硫黄島で火山性の地殻変動が見られる。

第6図の九州以西の図では、四国西部から九州北部にかけて、2018年春頃から始まった日向

灘北部・豊後水道での長期的SSEに伴う地殻変動が見られる。そのほか、中国・四国地方の西部から九州地方にかけて、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う変動が見られる。

[GNSS 差の差 3か月]

第7～9図は、最近3か月間の水平方向の地殻変動について、年周変化やプレート運動等の定常的な変動の影響を取り去った変動を見るため、1年前の同時期の水平変動ベクトルに対する差を示す図である。これらの図においては、前の期間に生じた地殻変動は、逆向きに表示される。また、最近の3か月間又は1年前の同時期にアンテナ交換を行った観測点の矢印は、白抜きの矢印で示している。

第7図の北海道・東北地方の図では、2018年4月頃までは東北地方から関東、甲信越、北陸地方にかけて西向きのベクトルが見られていたが、今回は特段の変動は見られない。これは、東北地方太平洋沖地震後の余効変動の減衰速度が小さくなってきたためと考えられる。


第8図の日本列島中央部の図では、四国西部で、2018年春頃から始まった日向灘北部・豊後水道での長期的SSEに伴う地殻変動が見られる。そのほか、小笠原村の硫黄島で島内の火山性の地殻変動速度が変化した影響が見られる。

第9図の九州以西の図では、2019年1月8日の種子島近海の地震に伴う地殻変動が見られる。また、四国西部から九州北部にかけて、2018年春頃から始まった日向灘北部・豊後水道での長期的SSEに伴う地殻変動が見られる。

[GNSS ひずみ変化]

第10～12図は、GNSSデータから推定した日本列島の最近1年間のひずみ変化を示す図である。第10図は日本全国のひずみ変化である。北海道南部から中部・北陸地方にかけて、東北地方太平洋沖地震後の余効変動の影響によるひずみが見られるほか、九州地方では熊本地震の余効変動によるひずみが見られる。また、北海道では2018年9月の北海道胆振東部地震に伴う地殻変動、房総半島では2018年6月頃のSSEに伴う地殻変動、九州北部から四国西部では2018年春頃から始まった日向灘北部・豊後水道での長期的SSEに伴う地殻変動によるひずみがそれぞれ見られる。第11～12図は、第10図を地方ごとに拡大した図である。第12図の中国・四国・九州地方の拡大図では、熊本地震の余効変動、日向灘北部・豊後水道での長期的SSEに伴う地殻変動の他、種子島近海の地震に伴う地殻変動によるひずみも見られる。


第13図は、第10図との比較のために、地震や余効変動の影響が少なかった1998年4月からの1年間のひずみ変化を、定常時のひずみ変化とみなして示したものである。定常時における東日本のひずみは概ね東西方向の縮みとなっている。




第1図 GNSS連続観測から求めた2018年4月～2019年4月の水平変動
Fig. 1 Annual horizontal displacement velocities at permanent GNSS sites during April 2018 – April 2019. (☆, Reference station is Fukue)



第2図 GNSS連続観測から求めた2018年4月～2019年4月の水平変動
Fig. 2 Annual horizontal displacement velocities at permanent GNSS sites during April 2018 – April 2019. (☆, Reference station is Fukue)




第3図 GNSS連続観測から求めた2018年4月～2019年4月の水平変動
 Fig. 3 Annual horizontal displacement velocities at permanent GNSS sites during April 2018 – April 2019. (☆, Reference station is Fukue)



第4図 GNSS連続観測から求めた2019年1月～2019年4月の水平変動
 Fig. 4 Horizontal displacements at GNSS sites during January 2019 – April 2019. (☆, Reference station is Fukue)


全国の地殻水平変動 3か月（2）

基準期間：2019/01/06 — 2019/01/20 [F3：最終解]
比較期間：2019/04/06 — 2019/04/20 [F3：最終解]




全国の地殻水平変動 3か月（3）

基準期間：2019/01/06 — 2019/01/20 [F3：最終解]
比較期間：2019/04/06 — 2019/04/20 [F3：最終解]




第5図 GNSS連続観測から求めた2019年1月～2019年4月の水平変動
Fig. 5 Horizontal displacements at GNSS sites during January 2019 – April 2019. (☆, Reference station is Fukue)

第6図 GNSS連続観測から求めた2019年1月～2019年4月の水平変動
Fig. 6 Horizontal displacements at GNSS sites during January 2019 – April 2019. (☆, Reference station is Fukue)



第 7 図 GNSS 水平変動の差 (3 ヶ月間)

Fig. 7 Variation of GNSS horizontal displacements: Difference of displacements between January 2018 – April 2018 and January 2019 – April 2019.



第 8 図 GNSS 水平変動の差 (3 ヶ月間)

Fig. 8 Variation of GNSS horizontal displacements: Difference of displacements between January 2018 – April 2018 and January 2019 – April 2019.


2 期間の地殻変動ベクトルの差 3 か月 (3)

基準期間：2018/01/06 — 2018/01/20 [F3：最終解]

基準期間：2019/01/06 — 2019/01/20 [F3：最終解]

比較期間：2018/04/06 — 2018/04/20 [F3：最終解]

比較期間：2019/04/06 — 2019/04/20 [F3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）・海底地形データはETOPO1 (Amante, C. & B. W. Eakins (2009)) を使用した。

第9図 GNSS水平変動の差（3ヶ月間）


Fig. 9 Variation of GNSS horizontal displacements: Difference of displacements between January 2018 – April 2018 and January 2019 – April 2019.

GNSS 連続観測から推定した日本列島のひずみ変化

- ・ 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・ 2016年4月の熊本地震の余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・ 2018年春頃から九州北部・四国西部で始まったプレート間のゆっくりすべり（スロースリップ）現象の影響によるひずみが見られる。
- ・ 2018年6月上旬頃の房総半島でのスロースリップ現象の影響によるひずみが見られる。
- ・ 2018年9月6日の北海道胆振東部地震の影響によるひずみが見られる。

基準期間：2018/04/06 – 2018/04/20 [F 3 : 最終解]

比較期間：2019/04/06 – 2019/04/20 [F 3 : 最終解]




- ・ GNSS 連続観測による変位ベクトルからひずみ変化図を作成した。
- ・ 海底地形データは ETOPO1 (Amante, C. & B. W. Eakins(2009)) を使用した。

第10図 GNSS連続観測データから推定した日本列島の水平歪（2018年4月～2019年4月）

Fig. 10 Horizontal strain in Japan derived from continuous GNSS measurements during April 2018 – April 2019.

GNSS 連続観測から推定した各地方のひずみ変化 (1)

- ・2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・2018年6月上旬頃の房総半島におけるプレート間のゆっくりすべり（スロースリップ）現象の影響によるひずみが見られる。
- ・2018年9月6日の北海道胆振東部地震の影響によるひずみが見られる。




- ・図は GNSS 連続観測による 1 年間の変位ベクトルから推定した各地方の地殻水平ひずみである。
- ・海底地形データは ETOPO1 (Amante, C. & B. W. Eakins(2009)) を使用した。

第11図 GNSS連続観測データから推定した北海道・東北および関東・中部・近畿地方の水平歪 (2018年4月～2019年4月)

Fig. 11 Horizontal strain in Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu and Kinki districts derived from continuous GNSS measurements during April 2018 – April 2019.

GNSS 連続観測から推定した各地方のひずみ変化 (2)

- ・2016年4月の熊本地震の余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・2018年春頃から九州北部・四国西部で始まったプレート間のゆっくりすべり（スロースリップ）現象の影響によるひずみが見られる。
- ・2019年1月の種子島近海の地震の影響によるひずみが見られる。



- ・図は GNSS 連続観測による 1 年間の変位ベクトルから推定した各地方の地殻水平ひずみである。
- ・海底地形データは ETOPO1 (Amante, C. & B. W. Eakins(2009)) を使用した。


第12図 GNSS連続観測データから推定した中国・四国・九州及び南西諸島地方の水平歪 (2018年4月～2019年4月)

Fig. 12 Horizontal strain in Chugoku, Shikoku, Kyushu and Nansei-islands districts derived from continuous GNSS measurements during April 2018 – April 2019.

GNSS 連続観測から推定した日本列島のひずみ変化 定常時・比較用

基準期間：1998/04/06 – 1998/04/20 [F 3 : 最終解]

比較期間：1999/04/06 – 1999/04/20 [F 3 : 最終解]



- ・ GNSS 連続観測による変位ベクトルからひずみ変化図を作成した。
- ・ 上図の期間は定常時の変動を示す（伊豆諸島周辺を除く）。
- ・ 海底地形データは ETOPO1（Amante, C. & B. W. Eakins(2009)）を使用した。

第13図 GNSS連続観測データから推定した日本列島の水平歪【定常時・比較用】

Fig. 13 Regular variation and comparison of horizontal strain in Japan derived from continuous GNSS measurements.