

## 9-1 西南日本における深部低周波微動活動 (2022 年 5 月～2022 年 10 月)

## Activity of deep low-frequency tremor in southwest Japan (May, 2022–October, 2022)

防災科学技術研究所

National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience

西南日本の沈み込み帯で発生する深部低周波微動<sup>1)</sup>は、フィリピン海プレートの走向に平行な帯状の領域内で時空間的に集中して発生し<sup>2)</sup>、短期的スロースリップイベント<sup>3)</sup>や周期 20 秒に卓越する超低周波地震<sup>4)</sup>を伴うことがある。2022 年 5 月から 2022 年 10 月までの 6 ヶ月間 (第 1, 2 図) で、短期的スロースリップイベント<sup>5)</sup>を伴った顕著な活動は、以下のとおりである。

- ・ 2022 年 5 月 19 日～30 日頃、紀伊半島北部から南部。この活動は三重県北部で開始し、北東および南西方向に活動域の移動がみられた。北東側の活動は 26 日頃に愛知県西部まで達して終息した。南西側の活動は奈良県南部まで達し、30 日頃まで継続してみられた (第 2, 4 図)。この領域での顕著な微動活動は、2021 年 11～12 月以来となる (第 3 図)。
- ・ 2022 年 9 月 30 日～10 月 5 日頃、紀伊半島北部。この活動は三重県中部で開始した後、北東方向への活動域の移動がみられた (第 2, 4 図)。この領域での顕著な活動は、上述の 2022 年 5 月以来となる (第 2, 3 図)。
- ・ 2022 年 9 月 3 日～8 日、四国中部から西部。この活動は愛媛県中部で開始した後、東西方向への活動域の拡大がみられた。この活動では 9 月 3 日 12:55 頃に愛媛県南西部、深さ約 42km で発生した M3.2 の地震 (Hi-net 暫定値) の後、13:05 過ぎから活動の開始がみられた (第 2, 6 図)。この領域での顕著な活動は 2021 年 12 月以来となる (第 3 図)。


以上の活動のほか、傾斜変動から短期的スロースリップイベントの断層モデルが推定されていない期間にも、東海地方では 2022 年 10 月 14 日～26 日頃に (第 4 図)、四国東部では 2022 年 5 月 1 日～11 日頃 (第 5 図) および 2022 年 7 月 26 日～30 日頃 (第 5 図)、2022 年 8 月 15 日～20 日頃 (第 6 図)、2022 年 10 月 16 日～23 日頃 (第 6 図) に、四国中部では 2022 年 6 月 15 日～23 日頃 (第 5 図) および 2022 年 8 月 24 日～30 日頃 (第 6 図) に、四国西部では 2022 年 6 月 13 日～17 日頃 (第 5 図) に、四国西部から豊後水道では 7 月 8 日～16 日頃 (第 5 図) に、豊後水道では 2022 年 8 月 11 日～14 日頃 (第 6 図) に、それぞれ微動活動の活発化がみられた。

(松澤孝紀・田中佐千子 (防災科研)・小原一成 (東大地震研))

MATSUZAWA Takanori, TANAKA Sachiko, and OBARA Kazushige


## 参考文献

- 1) Obara (2002), *Science*, **296**, 1679-1681.
- 2) Obara & Hirose (2006), *Tectonophysics*, **417**, 33-51.
- 3) Obara et al. (2004), *Geophys. Res. Lett.*, **31**, L23602.
- 4) Ito et al. (2007), *Science*, **315**, 503-506.
- 5) 防災科学技術研究所 (2023), 予知連会報, 本号, 西南日本における短期的スロースリップイベント (2022 年 5 月～2022 年 10 月).
- 6) Maeda & Obara (2009), *J. Geophys. Res.*, **114**, B00A09.
- 7) Obara et al. (2010), *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L13306.




第 1 図 西南日本で発生した深部低周波微動及び深部超低周波地震<sup>4)</sup>の月別震央分布。赤丸が当該期間の微動の震央を表す。この震央はエンベロープ相関・振幅分布ハイブリッド法<sup>6)</sup>及びクラスタリング処理<sup>7)</sup>によって 1 時間毎に自動処理された微動分布の重心である。青菱形は深部超低周波地震の震央を示す。

Fig. 1 Monthly epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes<sup>4)</sup> in southwest Japan from May 2022 to October 2022. Red circles indicate epicenters of tremor for the period shown in the upper-left corner. The epicenter is the centroid location from one-hour distribution estimated by the hybrid method based on the envelope correlation considering the spatial distribution of amplitude<sup>6)</sup> and clustering process<sup>7)</sup>. Blue diamonds indicate epicenters of deep very low-frequency earthquakes.




第 2 図 西南日本で発生した深部低周波微動（赤丸）及び深部超低周波地震（青菱形）の約 6 ヶ月間の時空間分布。  
 Fig. 2 Space-time plot of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes along the profile from southwest to northeast in southwest Japan for about six months. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.




第 3 図 西南日本で発生した深部低周波微動（赤丸）及び深部超低周波地震（青菱形）の 2003 年から約 20 年間の時空間分布。黄緑色太線は、傾斜変動から検出された短期的スロースリップイベントを示す。

Fig. 3 Space-time plot of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes along the profile from southwest to northeast in southwest Japan for about 20 years from January 2003. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1. Thick light green lines are short-term slow slip events detected by Hi-net tiltmeters.




第 4 図 2022 年 5 月から 2022 年 10 月までの期間に東海・紀伊半島地域で発生した、主な深部低周波微動及び深部超低周波地震の活動における震央分布スナップショット。赤丸が当該期間の微動、青菱形が超低周波地震を表す。

Fig. 4 Daily epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes in Tokai and Kii area for major episodes from May 2022 to October 2022. The time duration of each snapshot is shown in the upper-left corner. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.



第 5 図 2022 年 5 月から 2022 年 7 月までの期間に四国地域で発生した、主な深部低周波微動及び超低周波地震の活動における震央分布スナップショット。赤丸が当該期間の微動、青菱形が超低周波地震を表す。

Fig. 5 Daily epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes in Shikoku area for major episodes from May 2022 to July 2022. The time duration of each snapshot is shown in the upper-left corner. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.



第 6 図 2022 年 8 月から 2022 年 10 月までの期間に四国地域で発生した、主な深部低周波微動及び超低周波地震の活動における震央分布スナップショット。赤丸が当該期間の微動、青菱形が超低周波地震を表す。

Fig. 6 Daily epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes in Shikoku area for major episodes from August 2022 to October 2022. The time duration of each snapshot is shown in the upper-left corner. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.