

8-1 西南日本における深部低周波微動活動 (2023 年 5 月～2023 年 10 月) Activity of deep low-frequency tremor in southwest Japan (May, 2023 – October, 2023)

防災科学技術研究所

National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience

西南日本の沈み込み帯で発生する深部低周波微動¹⁾は、フィリピン海プレートの走向に平行な帯状の領域内で時空間的に集中して発生し²⁾、短期的スロースリップイベント³⁾や周期 20 秒に卓越する超低周波地震⁴⁾を伴うことがある。2023 年 5 月から 2023 年 10 月までの 6 ヶ月間 (第 1, 2 図) で、短期的スロースリップイベント⁵⁾を伴った顕著な活動は、以下のとおりである。


・2023 年 5 月 18 日～22 日頃、四国西部。この活動は愛媛県西部で発生し、東西方向への活動域の拡大がみられた。(第 2, 4 図)。この領域での顕著な微動活動は、2022 年 11 月以来となる (第 3 図)。

以上の活動のほか、傾斜変動から短期的スロースリップイベントの断層モデルが推定されていない期間にも、東海地方では 2023 年 9 月 13 日～18 日頃に (第 4 図)、紀伊半島北部では 2023 年 8 月 2 日～10 日頃に、紀伊半島中部から西部では 2023 年 7 月 15 日～22 日頃に (第 4 図)、四国東部では 2023 年 7 月 19 日～22 日頃に (第 5 図)、四国東部から四国中部では 2023 年 9 月 13 日～17 日頃に (第 5 図)、四国東部から西部では 2023 年 6 月 18 日～7 月 9 日頃に、豊後水道では 2023 年 8 月 16 日～20 日頃 (第 5 図) に、それぞれ微動活動の活発化がみられた。

(松澤孝紀・田中佐千子 (防災科研)・小原一成 (東大地震研))
MATSUZAWA Takanori, TANAKA Sachiko, and OBARA Kazushige


参考文献

- 1) Obara (2002), *Science*, **296**, 1679-1681.
- 2) Obara & Hirose (2006), *Tectonophysics*, **417**, 33-51.
- 3) Obara et al. (2004), *Geophys. Res. Lett.*, **31**, L23602.
- 4) Ito et al. (2007), *Science*, **315**, 503-506.
- 5) 防災科学技術研究所 (2024), *予知連会報*, **111**, 「西南日本における短期的スロースリップイベント (2023 年 5 月～2023 年 10 月)」.
- 6) Maeda & Obara (2009), *J. Geophys. Res.*, **114**, B00A09.
- 7) Obara et al. (2010), *Geophys. Res. Lett.*, **37**, L13306.




第 1 図 西南日本で発生した深部低周波微動及び深部超低周波地震⁴⁾の月別震央分布。赤丸が当該期間の微動の震央を表す。この震央はエンベロープ相関・振幅分布ハイブリッド法⁶⁾及びクラスタリング処理⁷⁾によって 1 時間毎に自動処理された微動分布の重心である。青菱形は深部超低周波地震の震央を示す。

Fig. 1 Monthly epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes⁴⁾ in southwest Japan from May 2023 to October 2023. Red circles indicate epicenters of tremor for the period shown in the upper-left corner. The epicenter is the centroid location from one-hour distribution estimated by the hybrid method based on the envelope correlation considering the spatial distribution of amplitude⁶⁾ and clustering process⁷⁾. Blue diamonds indicate epicenters of deep very low-frequency earthquakes.




第 2 図 西南日本で発生した深部低周波微動（赤丸）及び深部超低周波地震（青菱形）の約 6 ヶ月間の時空間分布。
 Fig. 2 Space-time plot of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes along the profile from southwest to northeast in southwest Japan for about six months. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.




第 3 図 西南日本で発生した深部低周波微動（赤丸）及び深部超低周波地震（青菱形）の 2003 年 5 月から約 20 年間の時空間分布。黄緑色太線は、傾斜変動から検出された短期的スロースリップイベントを示す。

Fig. 3 Space-time plot of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes along the profile from southwest to northeast in southwest Japan for about 20 years from May 2003. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1. Thick light green lines are short-term slow slip events detected by Hi-net tiltmeters.



第 4 図 2023 年 5 月から 2023 年 10 月までの期間に東海・紀伊半島地域で発生した、主な深部低周波微動及び深部超低周波地震の活動における震央分布スナップショット。赤丸が当該期間の微動、青菱形が超低周波地震を表す。

Fig. 4 Daily epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes in Tokai and Kii area for major episodes from May 2023 to October 2023. The time duration of each snapshot is shown in the upper-left corner. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.



第 5 図 2023 年 5 月から 2023 年 10 月までの期間に四国地域で発生した、主な深部低周波微動及び超低周波地震の活動における震央分布スナップショット。赤丸が当該期間の微動、青菱形が超低周波地震を表す。

Fig. 5 Daily epicentral distribution of deep low-frequency tremor and deep very low-frequency earthquakes in Shikoku area for major episodes from May 2023 to October 2023. The time duration of each snapshot is shown in the upper-left corner. Red circles and blue diamonds are the same as in Fig. 1.