

8-3 西南日本における短期的スロースリップイベント (2025 年 5 月～2025 年 10 月) Short-term slow slip events in southwest Japan (May, 2025 – October, 2025)

防災科学技術研究所

National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience

2025 年 5 月から 2025 年 10 月にかけて西南日本の深部低周波微動¹⁾に同期して発生した短期的スロースリップイベント^{2,3)} (SSE) について報告する。第 1 図に今回報告する SSE をまとめた。これまでのイベントの履歴については、連絡会報¹⁾を参照されたい。

(1) 2025 年 5 月 紀伊半島北部

2025 年 5 月 5 日～5 月 11 日に紀伊半島北部の観測点で、深部低周波微動と同期した SSE による傾斜変化がとらえられた (第 2 図)。傾斜変化ベクトル、データから推定された SSE の矩形断層モデル、モデルから計算される傾斜変化ベクトルを第 3 図に示した。SSE の規模は Mw 6.0 に推定され、すべり域は同期間の微動および超低周波地震⁵⁾ (VLFE) の震央とよく一致している。2025 年 1 月に同地域で Mw 6.1 の短期的 SSE が発生している⁶⁾。

(2) 2025 年 6 月 四国西部

2025 年 6 月 10 日～6 月 21 日に四国西部の観測点で、深部低周波微動と同期した SSE による傾斜変化がとらえられた (第 4 図)。傾斜変化ベクトル、データから推定された SSE の矩形断層モデル、モデルから計算される傾斜変化ベクトルを第 5 図に示した。SSE の規模は Mw 6.3 に推定され、すべり域は同期間の微動および VLFE の震央とよく一致している。2024 年 12 月に同地域で Mw 6.2 の短期的 SSE が発生している⁶⁾。

(木村 武志)


KIMURA Takeshi

謝辞

気象庁のホームページで公開されている気象台等の気象観測データを使用させていただきました。記して感謝いたします。


参考文献

- 1) 防災科学技術研究所 (2026), 予知連会報, 本号.
- 2) Obara, et al. (2004), *Geophys. Res. Lett.*, **31** (23), doi:10.1029/2004GL020848.
- 3) Hirose and Obara (2005), *Earth Planets Space*, **57** (10), 961-972.
- 4) Tamura et al. (1991), *Geophys. J. Int.*, **104**, 507-516.
- 5) Ito et al. (2007), *Science*, **315**, 503-506.
- 6) 防災科学技術研究所 (2025), 予知連会報, **114**, 344-349.




第 1 図 2025 年 5 月 1 日～2025 年 10 月 31 日の期間に検知された短期的 SSE (ピンク矩形)．同期間に発生した深部低周波微動 (赤点) 及び VLFE の震央 (青菱形) を重ねて表示した．

Fig. 1 Distribution of SSEs detected from May 1, 2025, to October 31, 2025. Red dots and blue diamonds show epicenters of tremors and VLFs, respectively.




第 2 図 2025 年 4 月 1 日から 2025 年 5 月 30 日までの傾斜時系列。観測点位置は第 3 図に示した。記録は上方向への変化が北・東下がり傾斜変動を表す。気圧応答・潮汐成分を BAYTAP-G⁴) により除去し、直線トレンドを補正した後の記録を示した。5 月 5 日～11 日の傾斜変化量を SSE によるものと仮定した。紀伊半島北部～愛知県西部での微動活動度・気象庁津観測点での気圧変化および雨量をあわせて表示した。

Fig. 2 Time series of tiltmeter records, daily tremor counts, atmospheric pressure change, and daily precipitation in the northern Kii Peninsula and Aichi Prefecture from April 1, 2025, to May 30, 2025. 'N' and 'E' that follow a four-character station code denote the northward and eastward ground-down tilt components, respectively. The tilt changes for the time windows indicated by the broken lines are assumed to be caused by an SSE. The atmospheric pressure and precipitation were observed at the JMA Tsu meteorological observatory. The displayed tilt records are detided and their atmospheric pressure responses are corrected with BAYTAP-G⁴).




第 3 図 2025 年 5 月紀伊半島北部の短期的 SSE の断層モデル。第 2 図の破線で示された期間に観測された傾斜変化ベクトル（青矢印）・このデータから推定された SSE の断層モデル（赤矩形・矢印）・モデルから計算される傾斜変化ベクトル（白抜き矢印）を示す。同じ期間の微動と VLF の震央を橙円と茶星印で示した。

Fig. 3 Observed tilt change vectors for the time windows indicated in Fig. 2 (blue arrows), the estimated fault slip (red arrow), rectangular fault location and geometry (pink rectangle) based on the tilt change vectors, and the calculated tilt changes due to the fault models (open arrows). Orange circles and stars show epicenters of the tremor activity and VLFs, respectively, that occurred in the time.



第 4 図 2025 年 5 月 25 日～7 月 1 日までの傾斜時系列. 図の見方は第 2 図と同様. 観測点位置は第 5 図に示した. 6 月 10 日～21 日の傾斜変化量を SSE によるものと仮定した. 四国西部での微動活動度・気象庁宇和島観測点での気圧変化および雨量をあわせて表示した.

Fig. 4 Same as Fig. 2 but for the records observed in the western Shikoku from May 25, 2025, to July 1, 2025. The tilt changes from June 10 to June 21 are assumed to be caused by an SSE. The atmospheric pressure and precipitation were observed at the JMA Uwajima meteorological observatory.



第 5 図 2025 年 6 月四国西部の短期的 SSE の断層モデル。図の見方は第 3 図と同じ。

Fig. 5 Same as Fig. 3 but for the June 2025 short-term SSE in the western Shikoku.