

1－3 日本全国の地殻変動

Crustal Deformations of Entire Japan

国土地理院

Geospatial Information Authority of Japan

1. 日本全国の地殻変動

[GNSS]

第 1～7 図は、GEONET による GNSS 連続観測から求めた最近 3 か月間及び 1 年間の全国の水平地殻変動である。国土地理院では必要に応じてアンテナ交換等の保守を行っており、これに伴うオフセットの補正を後日 F5.1 解が得られてから行っている。基準期間と比較期間を含む期間中にアンテナ交換が行われ、それによるオフセットを補正した観測点の変動ベクトルは、補正誤差が含まれる可能性があるため、白抜きの矢印で示し区別している。

[GNSS 3 か月]

第 1～3 図は、最近 3 か月間の水平変動ベクトル図である。

第 1 図の北海道・東北地方では、2025 年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖の地震後の余効変動が見られる。また、2011 年 3 月 11 日に発生した平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（M9.0、最大震度 7）の余効変動が見られる。道東地方では千島海溝沿いの太平洋プレートの沈み込みに伴う北西向きの変動が見られる。

第 2 図の日本列島中央部では、2025 年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖の地震後の余効変動が見られる。また、東北地方を中心に平成 23 年東北地方太平洋沖地震後の余効変動が見られる。紀伊半島から四国にかけては南海トラフ沿いのプレートの沈み込みに伴う北西向きの変動が見られる。中国地方では、2026 年 1 月 6 日に発生した島根県東部の地震に伴う地殻変動が見られる。そのほか、小笠原村の硫黄島（いおうとう）で火山性の地殻変動が見られる。

第 3 図の日本列島西部の図では、中国・四国地方の西部から九州地方にかけて、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う変動が見られる。また、2024 年 8 月 8 日及び 2025 年 1 月 13 日に発生した日向灘の地震後の余効変動が見られる。そのほか、2026 年 2 月末より活発化した宮古島北西沖の地震活動に伴う地殻変動も見られる。

[GNSS 差の差 3 か月]

第 4～6 図は、最近 3 か月間の水平方向の地殻変動について、年周変化やプレート運動等の定常的な変動の影響を取り去った変動を見るため、1 年前の同時期の水平変動ベクトルに対する差を示す図である。これらの図においては、前の期間に生じた地殻変動は、逆向きに表示される。また、最近の 3 か月間又は 1 年前の同時期にアンテナ交換等の保守を行った観測点の変動ベクトルは、白抜きの矢印で示している。

第 4 図の北海道・東北地方の図では、2025 年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖の地震後の余効変動が見られる。

第 5 図の日本列島中央部の図では、2025 年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖の地震後の余効変動が見られる。また、令和 6 年能登半島地震後の余効変動の影響が見られる。静岡県西部から愛知

県東部では、長期的ゆっくりすべりに伴う地殻変動が見られる。また、2026 年 1 月 6 日に発生した島根県東部の地震に伴う地殻変動が見られる。

第 6 図の日本列島西部の図では、2024 年 8 月 8 日の日向灘の地震後の余効変動の影響及び 2025 年 1 月 13 日に発生した日向灘の地震に伴う地殻変動の影響が見られる。また、2026 年 2 月末より活発化した宮古島北西沖の地震活動に伴う地殻変動が見られる。

[GNSS 1 年間]

第 7 図の最近 1 年間の全国の図においては、2025 年 11 月 9 日に発生した三陸沖の地震及び 2025 年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖の地震に伴う地殻変動が見られる。また、令和 6 年能登半島地震後の余効変動のほか、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の余効変動が顕著である。そのほか、道東地方では千島海溝沿いの太平洋プレートの沈み込みに伴う北西向きの変動、東海地方から九州にかけて、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う北西向きの変動が見られる。九州では、2024 年 8 月 8 日及び 2025 年 1 月 13 日に発生した日向灘の地震の余効変動や 2025 年 4 月 2 日に発生した大隅半島東方沖の地震に伴う地殻変動が見られる。そのほか、小笠原村の硫黄島では、火山性の地殻変動が見られる。また、2026 年 2 月末から活発化した宮古島北西沖の地震活動に伴う地殻変動が見られる。

[GNSS ひずみ変化]


第 8 図は、GNSS データから推定した日本列島の最近 1 年間のひずみ変化を示す図である。2025 年 11 月 9 日に発生した三陸沖の地震及び 2025 年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖の地震に伴うひずみが見られる。また、能登半島を中心に令和 6 年能登半島地震後の余効変動の影響によるひずみが見られる。そのほか、東北地方では、平成 23 年東北地方太平洋沖地震後の余効変動の影響によるひずみ、九州では 2024 年 8 月 8 日及び 2025 年 1 月 13 日に発生した日向灘の地震後の余効変動や 2025 年 4 月 2 日に発生した大隅半島東方沖の地震の影響によるひずみが見られる。また、山口県北部の地震活動に伴う地殻変動やトカラ列島近海の地震活動に伴うひずみが見られる。

第 9 図は、第 8 図の図との比較のために、地震や余効変動の影響が少なかった 1998 年 3 月からの 1 年間のひずみ変化を、定常時のひずみ変化とみなして示したものである。定常時における東日本のひずみはおおむね東西方向の縮みとなっている。

全国の地殻変動（水平） 3 か月（1）

基準期間：2025-12-21 — 2026-01-04 [F 5.1：最終解]

比較期間：2026-03-21 — 2026-04-04 [F 5.1：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）・海底地形データはETOP01 (Amante, C. & B. W. Eakins, 2009) を使用した。


第 1 図 GNSS 連続観測データから求めた 2026 年 1 月～2026 年 4 月の水平変動

Fig. 1 Horizontal displacements at GNSS sites during January 2026 – April 2026. (☆ , Reference station is Fukue)

全国の地殻変動（水平） 3 か月（2）

基準期間：2025-12-21 — 2026-01-04 [F 5.1：最終解]

比較期間：2026-03-21 — 2026-04-04 [F 5.1：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）・海底地形データはETOP01 (Amante, C. & B. W. Eakins, 2009) を使用した。


第 2 図 GNSS 連続観測データから求めた 2026 年 1 月～2026 年 4 月の水平変動（つづき）

Fig. 2 Horizontal displacements at GNSS sites during January 2026 – April 2026 (continued).

全国の地殻変動（水平） 3 か月（3）

基準期間：2025-12-21 — 2026-01-04 [F 5. 1：最終解]

比較期間：2026-03-21 — 2026-04-04 [F 5. 1：最終解]




☆ 固定局：福江（長崎県）・海底地形データはETOP01 (Amante, C. & B. W. Eakins, 2009) を使用した。

第 3 図 GNSS 連続観測データから求めた 2026 年 1 月～2026 年 4 月の水平変動（つづき）

Fig. 3 Horizontal displacements at GNSS sites during January 2026 – April 2026 (continued).

2 期間の地殻変動ベクトルの差 3 か月 (1)

基準期間 : 2024-12-21 — 2025-01-04 [F 5.1 : 最終解] 基準期間 : 2025-12-21 — 2026-01-04 [F 5.1 : 最終解]
比較期間 : 2025-03-21 — 2025-04-04 [F 5.1 : 最終解] 比較期間 : 2026-03-21 — 2026-04-04 [F 5.1 : 最終解]




☆ 固定局: 猿払 (北海道)・海底地形データはETOP01 (Amante, C. & B. W. Eakins, 2009) を使用した。

第 4 図 GNSS 連続観測データから求めた 2 期間の水平変動の差 (3 か月間)

Fig. 4 Differences of horizontal displacements at GNSS sites between January 2025 – April 2025 and January 2026 – April 2026.


2 期間の地殻変動ベクトルの差 3 か月 (2)

基準期間 : 2024-12-21 -- 2025-01-04 [F 5. 1 : 最終解] 基準期間 : 2025-12-21 -- 2026-01-04 [F 5. 1 : 最終解]
比較期間 : 2025-03-21 -- 2025-04-04 [F 5. 1 : 最終解] 比較期間 : 2026-03-21 -- 2026-04-04 [F 5. 1 : 最終解]



第 5 図 GNSS 連続観測データから求めた 2 期間の水平変動の差 (3 か月間) (つづき)

Fig. 5 Differences of horizontal displacements at GNSS sites between January 2025 – April 2025 and January 2026 – April 2026 (continued).




第 6 図 GNSS 連続観測データから求めた 2 期間の水平変動の差 (3 か月間) (つづき)

Fig. 6 Differences of horizontal displacements at GNSS sites between January 2025 – April 2025 and January 2026 – April 2026 (continued).

全国の地殻変動(水平) 1年間

基準期間 : 2025-03-21 -- 2025-04-04 [F 5. 1 : 最終解]

比較期間 : 2026-03-21 -- 2026-04-04 [F 5. 1 : 最終解]



☆ 固定局: 福江 (長崎県) ・海底地形データはETOP01 (Amante, C. & B. W. Eakins, 2009) を使用した。

第 7 図 GNSS 連続観測データから求めた 2025 年 4 月～2026 年 4 月の水平変動


Fig. 7 Horizontal displacements at GNSS sites during April 2025 – April 2026. (☆ , Reference station is Fukue)

GNSS 連続観測から推定した日本列島のひずみ変化

- ・平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・令和6年能登半島地震に伴う余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・2024年8月8日および2025年1月13日の日向灘の地震の余効変動の影響によるひずみが見られる。
- ・2025年4月2日の大隅半島東方沖の地震に伴う地殻変動の影響によるひずみが見られる。
- ・山口県北部の地震活動に伴う地殻変動の影響によるひずみが見られる。
- ・トカラ列島近海の地震活動に伴う地殻変動の影響によるひずみが見られる。
- ・2025年11月9日の三陸沖の地震に伴う地殻変動の影響によるひずみが見られる。
- ・2025年12月8日の青森県東方沖の地震に伴う地殻変動の影響によるひずみが見られる。

基準期間：2025-03-28 / 2025-04-11 [F 5. 1：最終解]

比較期間：2026-03-28 / 2026-04-11 [F 5. 1：最終解]




- ・GNSS 連続観測による変位ベクトルからひずみ変化図を作成した。
- ・海底地形データはETOPO1（Amante, C.&B.W.Eakins, 2009）を使用した。

第 8 図 GNSS 連続観測データから推定した日本列島の水平歪（2025 年 4 月～2026 年 4 月）

Fig. 8 Horizontal strain in Japan derived from continuous GNSS measurements during April 2025 – April 2026.

GNSS 連続観測から推定した日本列島のひずみ変化 定常時・比較用

基準期間：1998-03-28 / 1998-04-11 [F 5. 1：最終解]
比較期間：1999-03-28 / 1999-04-11 [F 5. 1：最終解]



- ・ GNSS 連続観測による変位ベクトルからひずみ変化図を作成した。
- ・ 上図の期間は定常時の変動を示す（伊豆諸島周辺を除く）。
- ・ 海底地形データは ETOPO1（Amante, C.&B.W.Eakins, 2009）を使用した。

第 9 図 GNSS 連続観測データから推定した日本列島の水平歪【定常時・比較用】

Fig. 9 Typical horizontal strain in Japan derived from continuous GNSS measurements.