3 - 12 関東・東海地域における歪観測結果

Observation of Crustal Strains by Borehole Strainmeters in Kanto and Tokai Districts

気象庁地震予知情報課
Earthquake Prediction Information Division
Japan Meteorological Agency

第1図は関東・東海地域における埋込式体積歪計の配置図である。図にみられるように、地域全体を6区域に分け、1981年5月以降の日平均値および毎時値はこの区域毎に示してある。

第2図から第4図までは、それぞれ1975年度設置分の東海地域、1976年度設置分の関東地域および1979年度設置分の東海地域における観測開始以来の歪変化の日平均値である。

第5図の(A)から(F)までは、それぞれ1981年5月以降の上記第1区から6区までの区域毎の歪変化の日平均値である。観測点名にCを付したものは気圧補正を施した値であり、その下はもとの値である。ATMは気圧変化で、第1区から3区までのものについては榛原の気圧により、第4区から6区までのものについては富津の気圧により補正してある。地点名のカッコ内数字は設置年度を示す。

第6図の(A)から(F)までは、それぞれ第1区から6区までの1981年11月から1982年4月までの歪変化の毎時値である。各図の最下段には、その区内の気象官署の降水量を示してある。第6図(C)の東伊豆の値は第5図(C)にみられるドリフトを除去したものである。

第7図の八日市場の記録に1月12日に縮みの異常変化が現れているが、第12図はこの変化のDCおよびAC記録である。これによると、12日15時30分頃から 0.4×10^{-6} 程度の縮みの変化が現れ、約20時間後の13日11時49分に茨城県南部にマグニチュード4.1の地震が起こった。なお、4月19日23時頃にも大きな縮みの変化があったが、これに対応する地震は認められなかった。第8図の網代の記録に3月10日に縮みの異常変化が現れているが、このDCおよびAC記録を第13図に示す。10日2時30分頃から 1×10^{-6} 程度の縮みの変化があったが、この頃から伊豆半島東岸付近で微小地震が発生しはじめ月末頃まで続いた。(気象庁地震予知情報課：「伊豆半島付近の地震活動」の項参照)

第3図 関東地域における埋込式歪計による歪変化（日平均値）

Fig. 3 Secular variations of ground-strains by borehole strainmeters in the Kanto District (daily mean values).

第4図 東海地域における埋込式歪計による歪変化（日平均値）

Fig. 4 Secular variation of ground-strains by borehole strainmeters in the Tokai District (daily mean values).

第5図 (A)～(F) 1981年5月以後の関東・東海地域における区域別歪変化(日平均値)

Fig. 5 (A) - (F) Variation of ground-strains by the region 1-6 shown in Fig. 1 in the Kanto and Tokai Districts after May, 1981 (daily mean values).
c- : Values corrected for barometric pressure.

第4区

第5区

第6区

第5図つづき

Fig. 5 (Continued)

C-IRAKO
IRAKO(75)
C-GAMAGORI
GAMAGORI(79)

C-MIKKABI
MIKKABI(75)
C-TENRYU
TENRYUC(79)
C-KAWANE
KAWANE(79)

ATM.-HAIBARA

PREC.-HAMAMATSU

NOV.
1981

DEC.

JAN.

NO.1

C-IRAKO
IRAKO(75)
C-GAMAGORI
GAMAGORI(79)
C-MIKKABI
MIKKABI(75)

C-TENRYU
TENRYUC(79)
C-KAWANE
KAWANE(79)

ATM.-HAIBARA

PREC.-HAMAMATSU

FEB.
1982

MAR.

APR.

(A)

NO.1

第6図 (A)~(F) 1981年11月~1982年4月の歪変化(毎時値)

Fig. 6 (A) - (F) Variation of ground-strains from November, 1981 - April, 1982 (hourly values).

C-SHIZUOKA
SHIZUOKAC(75)

C-FUJIEDA
FUJIEDAC(79)

C-HAIBARA
HAIBARAC(76)
C-HAMAOKA
HAMAOKAC(76)

C-OMAEZAKI
OMAEZAKI(75)
ATM.-HAIBARA

PREC.-SHIZUOKA

NO.2

C-SHIZUOKA
SHIZUOKAC(75)

C-FUJIEDA
FUJIEDAC(79)

C-HAIBARA
HAIBARAC(76)
C-HAMAOKA
HAMAOKAC(76)

C-OMAEZAKI
OMAEZAKI(75)
ATM.-HAIBARA

PREC.-SHIZUOKA

NO.2

(B)

第6図 つづき
Fig. 6 (Continued)

C-FUJI
FUJI(79)
C-SHIMIZU
SHIMIZUC(79)
C-AJIRO
AJIRO(76)
CD-HIGASHIIZU
D-HIGASHIIZU
C-T01
T01(79)
C-IROZAKI
IROZAKI(75)
ATM.-HAIBARA
PREC.-AJIRO

NO.3

C-FUJI
FUJI(79)
C-SHIMIZU
SHIMIZUC(79)
C-AJIRO
AJIRO(76)
CD-HIGASHIIZU
D-HIGASHIIZU
C-T01
T01(79)
C-IROZAKI
IROZAKI(75)
ATM.-HAIBARA
PREC.-AJIRO

NO.3

(C)
第6図 つづき
Fig. 6 (Continued)

NO.4

NO.4

(D)

第6図 つづき
Fig. 6 (Continued)

(E)

第6図 つづき
Fig. 6 (Continued)

第6図 つづき
Fig. 6 (Continued)

第7図 1982年1月12日の八日市場における異常変化

Fig. 7 Anomalous variation of the ground-strain on January 12, 1982 at Yokaichiba. Upper and lower figures indicate DC and AC components, respectively.

第8図 1982年3月10日の網代における異常変化

Fig. 8 Anomalous variation of the ground-strain on March 10, 1982 at Ajiro. Upper and lower figures indicate AC and DC components, respectively.