**7 - 8 北陸-近畿および近畿-山陰地殻活動総合観測線における連続観測結果
(1998年2月~1999年1月)**

**Results from Monitoring Chains of Crustal Activities in Kinki District
(February 1, 1998-January 31, 1999)**

京都大学 防災研究所・理学研究科
Disaster Prevention Research Institute and
Graduate School of Science,
Kyoto University

北陸-近畿および近畿-山陰の両地殻活動総合観測線を構成する観測点のうちから、第1図に示す上宝、逢坂山、由良、六甲鶴甲および紀州の5観測点で観測された最近1年間(1998年2月1日 - 1999年1月31日)の地殻ひずみおよび傾斜を第2図から第6図に示す。

これらの記録には降雨あるいは計器の不調による変化を除いて、この期間にとくに取り上げて議論すべき変動は見られない。

なお、紀州では、第5図上段の図に見られるように、3台の水管傾斜計を設置して観測を行っているが、下段のベクトル図はN89EおよびN129Eの2台を用いて求めた結果である。両者の設置方向が直交していないため、南北の傾斜は誇張される傾向にあることに注意されたい。

第1図 観測点の位置図
 Fig.1 Observation stations.

第2図 上宝におけるひずみ変化 (1998年2月~1999年1月)

Fig.2 Strain change at Kamitakara (February 1998 - January 1999).

第3図 上宝における傾斜変化 (1998年2月~1999年1月)

Fig.3 Tilt change at Kamitakara (February 1998 - January 1999).

第4図 由良および紀州におけるひずみ変化 (1998年2月~1999年1月)

Fig.4 Strain changes at Yura and Kishu (February 1998 - January 1999).

YURA TILT (WATER-TUBES)
FEB. 01, 1998 - JAN. 31, 1999

KISHU TILT (WATER-TUBES IN N89E & N129E)
JUN. 19, 1998 - JAN. 31, 1999

第5図 由良および紀州における傾斜変化 (1998年2月~1999年1月)

Fig.5 Tilt changes at Yura and Kishu (February 1998 - January 1999).

第6図 六甲鶴甲・逢坂山におけるひずみ変化(1998年2月~1999年1月)
 Fig.6 Strain changes at Rokko-tsurukabuto and Osakayama (February 1998 - January 1999).