

粟 島 (3602)

観測開始:1965年6月 所在地:新潟県岩船郡粟島浦村

(単位:m)

観測年月			1965.4 (昭和40年)	1965.1 (昭和40年)	1966.9 (昭和41年)	1967.9 (昭和42年)	1968.9 (昭和43年)	1970.1 (昭和45年)
取付水準点		標高 (m)	—	—	—	—	—	—
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	—	—	—	—	—	—
		球分体	+0.572	+0.579	+0.580	+0.580	+0.581	+0.581
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考								

観測年月			1973.7 (昭和48年)	1981.3 (昭和56年)				
取付水準点		標高 (m)	—	験潮場移設				
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	—					
		球分体	+0.580					
観測方法			2級水準					
備考								

観測年月			1981.3 (昭和56年)	1983.3 (昭和58年)	1989.9 (平成元年)	1994.1 (平成6年)	1994.1 (平成6年)	1994.1 (平成6年)
取付水準点	101	標高 (m)	—	—	—	—	験潮場移設	—
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	—	—	—	—		—
		球分体	+0.653	+0.649	+0.646	+0.646		+0.632
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準		2級水準
備考			球分体変更					

観測年月			1994.3 (平成6年)	1995.1 (平成7年)	1996.3 (平成8年)	1999.5 (平成11年)	2001.8 (平成13年)	2002.4 (平成14年)
取付水準点	101	標高 (m)	—	2.8797	2.8797	2.8797	2.8797	2.8580
距離 (km)	B・M	高低差 (m)	—	-0.7702	-0.7700	-0.771	-0.770	-0.770
		球分体	+0.632	+0.6295	+0.6292	+0.632	+0.631	+0.631
観測方法			2級水準	一等水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考						地殻変動観測点101をⅡ □10476に名称変更	2000年度平均 成果に切換	

(単位：m)

観測年月			2005.1 (平成17年)	2007.1 (平成19年)	2008.9 (平成20年)	2009.1 (平成21年)	2012.12 (平成24年)	2016.9 (平成28年)	
取付水準点	II 10476	標高 (m)	2.8580	2.8580	2.8580	2.8580	2.8580	2.8580	
		距離 (km)	B・M	高低差 (m)	-0.769	-0.7690	-0.769	-0.769	-0.769
				球分体	+0.629	+0.629	+0.629	+0.630	+0.630
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考									

観測年月			2017.10 (平成29年)	2020.8 (令和2年)				
取付水準点	II 10476	標高 (m)	2.8580	2.8580				
		距離 (km)	B・M	高低差 (m)	-0.769	-0.769		
				球分体	+0.628	+0.628		
観測方法			2級水準	2級水準				
備考								

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。