厳　原　(3503)

観測開始:1947年7月　所在地:長崎県対馬市厳原町東里

(単位 : m)

観測年月			1950.6 (昭和25年)	1951.5 (昭和26年)	1952.5 (昭和27年)	1960.4 (昭和35年)		
取付水準点	対 1	標高(m)	3.2693	—	3.2693	験潮場移設		
距離(km) —	B・M	高低差(m)	-0.809	—	-0.823			
距離(km) —	球分体	高低差(m)	—	-0.380	-0.365			
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準			
備考								

観測年月			1960.4 (昭和35年)	1964.3 (昭和39年)	1969.2 (昭和44年)	1973.1 (昭和48年)	1974.5 (昭和49年)	1982.12 (昭和57年)
取付水準点	対 1	標高(m)	3.2693	3.2693	3.2693	—	3.2693	3.2693
距離(km) 0.87	B・M	高低差(m)	-0.812	-0.809	-0.853	—	-0.848	-0.881
距離(km) 0.05	球分体	高低差(m)	-0.193	-0.212	-0.189	-0.192	-0.196	-0.201
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考					B·M再設			

観測年月			1982.12 (昭和57年)	1984.3 (昭和59年)	1984.3 (昭和59年)			
取付水準点	対 1	標高(m)	3.2693	—	験潮場移設			
距離(km) 0.90	B・M	高低差(m)	-0.767	—				
距離(km) 0.04	球分体	高低差(m)	-0.315	-0.317				
観測方法			2級水準	2級水準				
備考			B·M変更					

観測年月			1984.3 (昭和59年)	1984.6 (昭和59年)	1990.1 (平成2年)	1995.9 (平成7年)	2001.6 (平成13年)	2002.4 (平成14年)
取付水準点	対 1 (TUSIMA01)	標高(m)	—	3.2693	3.2693	3.2693	3.2693	3.225
距離(km) 0.90	B・M	高低差(m)	—	-0.746	-0.748	-0.742	-0.740	-0.740
距離(km) 0.04	球分体	高低差(m)	-0.425	-0.426	-0.426	-0.424	-0.426	-0.426
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備考			球分体変更					2000年度平均成果に切換

（単位：m）

観測年月				2006.6 （平成18年）	2011.9 （平成23年）	2013.10 （平成25年）	2017.3 （平成29年）	2025.4 （令和7年）	
取付水準点		対　1 （TUSIMA01）	標高 (m)	3.225	3.225	—	3.225	3.132	
距離 (km)	0.90	B・M	高低差 (m)	-0.743	-0.747	—	+1.388	—	
	0.04	球分体		-0.424	-0.424	-0.423	+0.226	—	
観測方法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準		
備考								測地成果 2024に切換	

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>