

鹿 児 島 (2501)

観測開始:1948年1月 所在地:鹿児島県鹿児島市本港新町

(単位:m)

観測年月			1958.2 (昭和33年)	1962.11 (昭和37年)	1964.5 (昭和39年)	1966.3 (昭和41年)	1968.1 (昭和43年)	1969.6 (昭和44年)
取付水準点		2469	標高 (m)	3.8413	3.8413	3.8413	3.8413	3.8413
距離 (km)	3.20	B・M	高低差 (m)	-1.3534	-1.3696	-1.3564	-1.3548	-1.3540
	0.25			-0.280	-0.3100	-0.3165	+0.6866	+0.6814
		球分体						
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	一等水準	1級水準
備考						球分体再設		

観測年月			1972.7 (昭和47年)	1972.5 (昭和47年)				
取付水準点		2469	標高 (m)	3.8413	験潮場移設			
距離 (km)	3.20	B・M	高低差 (m)	-0.6857				
	0.25							
		球分体						
観測方法			1級水準					
備考								

観測年月			1972.7 (昭和47年)	1973.9 (昭和48年)	1975.12 (昭和50年)	1978.12 (昭和53年)	1981.11 (昭和56年)	1982.1 (昭和57年)
取付水準点		2469	標高 (m)	3.8413	3.8413	—	—	3.8413
距離 (km)	3.20	B・M	高低差 (m)	-1.8831	-1.8806	—	—	-1.8951
	0.25			+2.6755	+2.6744	+2.6710	+2.6640	+2.6480
		球分体						
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								

観測年月			1988.11 (昭和63年)	1994.1 (平成6年)	2000.1 (平成12年)	2002.6 (平成14年)	2004.12 (平成16年)	2010.3 (平成22年)
取付水準点		2469	標高 (m)	3.8413	3.8413	4.3909	4.6163	4.6163
距離 (km)	3.20	B・M	高低差 (m)	-1.8470	-1.8499	-2.4044	-2.4044	+0.185
	0.25			+2.5883	+2.5856	+2.5874	+2.5812	
		球分体						+2.581
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	二等水準	1級水準
備考					取付水準点は2468			
					2468改測 (1997.6)	2000年平均 成果に切換		付属点移設

(単位：m)

観測年月			2012.3 (平成24年)		2012.2 (平成24年)	2020.9 (令和2年)		
取付水準点		2469	験潮場移設		4.2033	4.2033		
距離 (km)	3.20	B・M			-1.7300	-1.7995		
	0.25				+0.2156	+0.2137		
		球分体						
観測方法					1級水準	1級水準		
備考					測地成果 2011に切換			

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。