

呉 (3401)

観測開始:1962年6月 所在地:広島県呉市宝町

(単位:m)

| 観測年月       |        |     | 1962.6<br>(昭和37年) | 1968.2<br>(昭和43年) | 1974.11<br>(昭和49年) | 1977.9<br>(昭和52年) | 1985.3<br>(昭和60年) | 1993.11<br>(平成5年) |        |
|------------|--------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 取付水準点      | II-314 |     | 3.235             | 3.235             | 3.235              | 3.235             | 3.235             | 3.440             |        |
| 距離<br>(km) | 1.14   | B・M | 標高<br>(m)         | -0.235            | +0.352             | +0.061            | +0.061            | +0.073            | +0.080 |
|            | 0.06   |     |                   | 高低差<br>(m)        | -0.310             | -0.678            | -0.682            | -0.686            | -0.407 |
| 球分体        |        |     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |        |
| 観測方法       |        |     | 2級水準              | 2級水準              | 2級水準               | 2級水準              | 2級水準              | 2級水準              |        |
| 備考         |        |     |                   | B・M, 球分体再設        |                    |                   | 球分体変更             | II-314改算(1993.1)  |        |

| 観測年月       |        |     | 1998.5<br>(平成10年) | 1998.5<br>(平成10年) | 2002.4<br>(平成14年) | 2003.1<br>(平成15年) | 2004.1<br>(平成16年) | 2008.7<br>(平成20年) |        |
|------------|--------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 取付水準点      | II-314 |     | 3.440             | 3.440             | 3.451             | 3.451             | 3.451             | 3.451             |        |
| 距離<br>(km) | 1.14   | B・M | 標高<br>(m)         | +0.083            | -0.568            | -0.568            | -0.567            | -0.570            | -0.567 |
|            | 0.06   |     |                   | 高低差<br>(m)        | -0.433            | +0.218            | +0.218            | +0.210            | +0.209 |
| 球分体        |        |     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 観測方法       |        |     | 2級水準              | 2級水準              | 2級水準              | 2級水準              | 2級水準              | 2級水準              |        |
| 備考         |        |     |                   | B・M変更             | 2000年度平均成果に切換     |                   |                   |                   |        |

| 観測年月       |        |     | 2013.9<br>(平成25年) | 2018.10<br>(平成30年) | 2021.12<br>(令和3年) |        |        |  |
|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|--|
| 取付水準点      | II-314 |     | 3.451             | 3.451              | —                 |        |        |  |
| 距離<br>(km) | 1.14   | B・M | 標高<br>(m)         | -0.569             | -0.569            | —      |        |  |
|            | 0.06   |     |                   | 高低差<br>(m)         | +0.210            | +0.207 | +0.209 |  |
| 球分体        |        |     |                   |                    |                   |        |        |  |
| 観測方法       |        |     | 2級水準              | 2級水準               | 2級水準              |        |        |  |
| 備考         |        |     |                   |                    |                   |        |        |  |

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。  
「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。  
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>  
その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。  
また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。