釧　路　(2102)

観測開始:1947年1月　所在地:北海道釧路市港町

(単位：m)

観測年月				1952.5 (昭和27年)	1953.8 (昭和28年)	1953.1 (昭和28年)	1957.9 (昭和32年)	1959.1 (昭和34年)	
取付水準点		交7606	標高(m)	31.6712	31.6712	31.6712	31.6712	験潮場移設	
距離(km)	—	B・M	高低差(m)	-29.1893	-29.1898	-29.9818	—		
	—					+0.7935	+0.7950		
		球分体							
観測方法				一等水準	一等水準	1級水準	1級水準		
備考									

観測年月				1969.9 (昭和44年)	1971.6 (昭和46年)	1972.9 (昭和47年)	1973.7 (昭和48年)	1975.6 (昭和50年)	1975.8 (昭和50年)
取付水準点		交7606	標高(m)	31.6712	31.6712	31.6712	31.6712	31.6712	31.6712
距離(km)	1.25	B・M	高低差(m)	—	—	-29.9781	-29.9774	—	-29.3004
	0.15			+0.3118	+0.3118	+0.3115	+0.3046	-0.3720	-0.3711
		球分体							
観測方法				1級水準	一等水準	1級水準	一等水準	1級水準	一等水準
備考								B·M 再設 (1975.3)	

観測年月				1981.11 (昭和56年)	1982.12 (昭和57年)	1982.12 (昭和57年)	1986.8 (昭和61年)	1993.5 (平成5年)	1994.11 (平成6年)
取付水準点		交7606	標高(m)	31.6712	験潮場移設	31.6712	31.6712	31.6712	31.6712
距離(km)	1.25	B・M	高低差(m)	-29.2280		—	-29.2465	-29.2581	-29.2602
	0.15			-0.4367		+0.0022	-0.0002	-0.0163	-0.0203
		球分体							
観測方法				1級水準		1級水準	一等水準	一等水準	一等水準
備考				B·M 再設					

観測年月				1996.5 (平成8年)	2001.1 (平成13年)	2002.4 (平成14年)	2003.11 (平成15年)	2004.9 (平成16年)	2009.11 (平成21年)
取付水準点		交7606	標高(m)	31.6712	31.6712	31.3654	31.3654	30.7380	30.7380
距離(km)	—	B・M	高低差(m)	-29.2588	-29.2610	-29.2610	-29.2669	-28.6493	-28.650
	—			-0.0213	-0.0219	-0.0219	-0.0289	-0.0293	-0.033
		球分体							
観測方法				一等·1級水準	1級水準	一等·1級水準	一等水準	一等水準	一等水準
備考						2000年平均成果に切換		改算成果 (2005.4)	

（単位：m）

観測年月				2011.11 （平成23年）	2012.9 （平成24年）	2017.8 （平成29年）	2019.6 （令和元年）	2022.7 （令和4年）	2025.4 （令和7年）
取付水準点		交7606	標高 (m)	30.7380	30.7380	30.7380	—	30.738	30.521
距離 (km)	—	B・M	高低差 (m)	-28.693	-28.649	-28.6479	—	-28.6483	—
	—	球分体		—	-0.031	-0.0315	-0.0327	-0.0321	—
観測方法				一等水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	
備考				測地成果 2011に切換					測地成果 2024に切換

・測地成果2024については、以下のHPをご覧下さい。
全国の標高成果の改定 <https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>
・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧下さい。
<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>