

門 司 (3403)

観測開始:1958年11月 所在地:福岡県北九州市門司区旧門司

(単位:m)

観測年月			1959.3 (昭和34年)	1960.6 (昭和35年)	1967.2 (昭和42年)	1970.11 (昭和45年)	1972.5 (昭和47年)	1978.11 (昭和53年)	
取付水準点	1773		標高(m)	13.1332	13.1332	13.1332	2.6907	13.1332	13.1332
距離(km)	0.77	B・M	高低差(m)	-4.071	-4.071	-9.866	+0.5461	-9.864	-9.867
	0.05			-6.919	-6.919	-1.142	-1.1452	-1.149	-1.146
			球分体						
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	
備考					B・M移設	取付水準点は002-536			

観測年月			1984.5 (昭和59年)	1989.5 (平成元年)	1990.1 (平成2年)	1991.9 (平成3年)	1994.11 (平成6年)	1996.1 (平成8年)	
取付水準点	K-7		標高(m)	8.4350	8.4350	13.1110	—	8.4350	—
距離(km)	0.05	B・M	高低差(m)	-5.215	-5.227	-9.8902	—	-5.225	—
				-1.152	-1.154	-1.1507	-1.154	-1.151	-0.662
			球分体						
観測方法			2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考					取付水準点は1773			球分体変更	

観測年月			2000.12 (平成12年)	2002.4 (平成14年)	2006.1 (平成18年)	2006.9 (平成18年)	2008.3 (平成20年)	
取付水準点	K-7		標高(m)	8.4350	8.3666	8.3666	8.3666	験潮場廃止
距離(km)	0.05	B・M	高低差(m)	-5.228	-5.228	-5.236	-5.2315	
				-0.664	-0.664	-0.665	-0.6633	
			球分体					
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	一等水準		
備考				2000年度平均成果に切換				

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。  
「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。  
<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>  
その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。  
また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。