

紋 別 (3701)

観測開始:1955年12月 所在地:北海道紋別市弁天町

(単位:m)

観測年月			1956.6 (昭和31年)	1966.12 (昭和41年)	1968.9 (昭和43年)	1971.7 (昭和46年)	1973.9 (昭和48年)	1978.1 (昭和53年)	
取付水準点		8948	標高 (m)	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	
距離 (km)	0.56	B・M		高低差 (m)	-10.599	—	-7.041	-10.2205	-7.044
					+0.440	-3.173	-3.178		-3.192
		球分体							
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	
備考				BM変更					

観測年月			1978.1 (昭和53年)	1966.12 (昭和41年)	1968.9 (昭和43年)	1971.7 (昭和46年)	1973.9 (昭和48年)	1978.1 (昭和53年)	
取付水準点		8948	標高 (m)	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	
距離 (km)	0.56	B・M		高低差 (m)	—	-7.041	-10.2205	-7.044	-10.271
					-3.173	-3.178		-3.192	
		球分体							
観測方法			2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準	
備考				BM変更					

観測年月			1978.1 (昭和53年)	1984.8 (昭和59年)	1991.6 (平成3年)	1996.6 (平成8年)			
取付水準点		8947	標高 (m)	12.0412	—	6.8238	6.9298		
距離 (km)	—	B・M		高低差 (m)	-6.857	—	-1.636	-1.728	
					-3.113	-3.116	-3.119	-3.120	
		球分体							
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準			
備考			BM、球分体 変更 取付水準点 は8948			8947移転 (1995.7)			

(単位：m)

観測年月			2001.8 (平成13年)	2002.9 (平成14年)	2003.1 (平成15年)	2005.8 (平成17年)	2006.6 (平成18年)	2008.3 (平成20年)
取付水準点	8948		12.0412	11.9507	—	11.9507	11.9507	験潮場廃止
距離 (km)	—	B・M	-6.863	—	—	-9.8021	-9.8040	
	—		-3.117	-3.119	-2.940			
		球分体						
観測方法			2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	一等水準	
備考				2000年度平均成果に切換	球分体変更			

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。