

大船渡 (2203)

観測開始:1963年8月 所在地:岩手県大船渡市赤崎町

(単位:m)

観測年月			1963.1 (昭和38年)	1964.12 (昭和39年)	1966.1 (昭和41年)	1968.1 (昭和43年)	1969.9 (昭和44年)	1973.12 (昭和48年)	
取付水準点	6788		標高 (m)	2.4452	—	—	—	4.3463	—
距離 (km)	12.0	B・M	高低差 (m)	-1.0276	—	—	—	-2.9797	—
	0.07			+1.8465	+1.8420	+1.8410	+1.8380	+1.8392	+1.8394
球分体									
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	
備考							6788再設 (1966.11)		

観測年月			1974.5 (昭和49年)	1974.5 (昭和49年)				
取付水準点	6788		標高 (m)	4.3463	験潮場移設			
距離 (km)	12.0	B・M	高低差 (m)	-2.9959				
	0.07			+1.8394				
球分体								
観測方法			1級水準					
備考								

観測年月			1974.5 (昭和49年)	1975.1 (昭和50年)	1978.11 (昭和53年)	1980.12 (昭和55年)	1983.11 (昭和58年)	1985.11 (昭和60年)
取付水準点	6788		標高 (m)	4.3463	—	—	—	4.3460
距離 (km)	12.0	B・M	高低差 (m)	-2.7075	—	—	—	-2.717
	0.07			+1.8797	+1.8772	+1.8660	+1.8632	+1.8629
球分体								
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準
備考								

観測年月			1992.1 (平成4年)	1995.3 (平成7年)	1996.2 (平成8年)	2002.4 (平成14年)	2005.10 (平成17年)	2008.9 (平成20年)	
取付水準点	6788		標高 (m)	4.3463	—	—	4.1979	4.3173	—
距離 (km)	12.0	B・M	高低差 (m)	-2.7140	—	—	-2.7140	-2.8287	—
	0.07			+1.8602	+1.8597	+1.8601	+1.8601	+1.8500	+1.8494
球分体									
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	
備考						2000年平均 成果に切換	6788移転 (2003.8)		

(単位：m)

観測年月			2010.2 (平成22年)	2012.6 (平成24年)	2016.6 (平成28年)	2017.10 (平成29年)	2021.1 (令和3年)	
取付水準点	12.0	6788	4.3173	3.6187	—	10.7607	—	
		B・M						
	0.07		-2.825	-2.904	—	-9.8197	—	
		球分体	+1.846	+1.830	+1.8285	+1.8286	+1.8280	
観測方法			1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	1級水準	
備考				6788改測 (2011.8)		取付水準点 6790		

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。